

Homöopathische Haus- und Notfallapotheke des DZVhÄ

Gebrauchsinformation

Homöopathisches Arzneimittel zum Einnehmen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Bei fortdauernden Krankheitssymptomen während der Anwendung des Arzneimittels ist medizinischer Rat einzuholen.

Wechselwirkungen

Keine bekannt. Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel (u.a. Bier, Kaffee, Säuren, Wein und Zitronensaft) ungünstig beeinflusst werden.

Wie bei allen homöopathischen Arzneimitteln kann die Wirkung der Arzneimittel durch die gleichzeitige oder nachfolgende Gabe anderer Arzneimittel verändert werden. Wenn Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie ihren Arzt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose (Saccharose/Zucker). Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Zur Dosierung, Dauer und Art der Anwendung befragen Sie Ihren homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Die Einzelgabe eines homöopathischen Arzneimittels sollte möglichst klein sein. Nach jeder Gabe ist die Wirkung abzuwarten. Erstverschlimmerung und Arzneimittelprüfsymptomatik sind zu berücksichtigen.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewandt werden.

Was ist bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren zu beachten?

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren erfolgt nur nach Rücksprache mit dem homöopathisch erfahrenen Therapeuten.

Nebenwirkungen

Keine bekannt

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Angaben zur Haltbarkeit

Das Verfallsdatum ist auf dem Etikett angegeben. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach Ablauf dieses Datums. Haltbarkeit nach Anbruch des Gefäßes: 24 Monate

Zusammensetzung

Apothekenpflichtig.

Homöopathische Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

In 1,5 g Streukügelchen (Größe 2) sind verarbeitet

Wirkstoffe:

Acon.	Dil. C12, 0,015 g	Aconitum napellus; Reg.-Nr.: 9555.55.52
Apisin.	Dil. C12, 0,015 g	Apisinum; Reg.-Nr.: 25134.00.00
Arn.	Dil. C12, 0,015 g	Arnica montana e planta tota; Reg.-Nr.: 1955.55.52
Ars.	Dil. C12, 0,015 g	Acidum arsenicosum; Reg.-Nr.: 1555.55.52
Bell.	Dil. C12, 0,015 g	Atropa bella-donna; Reg.-Nr.: 2155.55.52
Bell-p.	Dil. C12, 0,015 g	Bellis perennis; Reg.-Nr.: 2745.55.52
Bry.	Dil. C12, 0,015 g	Bryonia; Reg.-Nr.: 2855.55.52
Calen.	Dil. C12, 0,015 g	Calendula officinalis; Reg.-Nr.: 2815.55.52
Canth.	Dil. C12, 0,015 g	Lytta vesicatoria; Reg.-Nr.: 65283.00.00
Caust.	Dil. C12, 0,015 g	Causticum H.; Reg.-Nr.: 80340.00.00
Cham.	Dil. C12, 0,015 g	Chamomilla recutita; Reg.-Nr.: 2875.55.52
Chin.	Dil. C12, 0,015 g	Cinchona pubescens; Reg.-Nr.: 3755.55.52
Coloc.	Dil. C12, 0,015 g	Citrullus colocynthis;
Eup-per.	Dil. C12, 0,015 g	Eupatorium perfoliatum; Reg.-Nr.: 1605.55.52
Ferr-p.	Dil. C12, 0,015 g	Ferrum phosphoricum;
Gels.	Dil. C12, 0,015 g	Gelsemium sempervirens; Reg.-Nr.: 1725.55.52
Hep.	Dil. C12, 0,015 g	Hepar sulfuris calcareum;
Hyper.	Dil. C12, 0,015 g	Hypericum perforatum; Reg.-Nr.: 8855.55.52
Ign.	Dil. C12, 0,015 g	Strychnos ignatii;
Lach.	Dil. C12, 0,015 g	Lachesis mutus; Reg.-Nr.: 80342.00.00
Led.	Dil. C12, 0,015 g	Ledum palustre; Reg.-Nr.: 9355.55.52
Nux-v.	Dil. C12, 0,015 g	Strychnos nux-vomica;
Phos.	Dil. C12, 0,015 g	Phosphorus; Reg.-Nr.: 3505.55.52
Phyt.	Dil. C12, 0,015 g	Phytolacca americana; Reg.-Nr.: 1015.55.52
Puls.	Dil. C12, 0,015 g	Pulsatilla pratensis;
Rhus-t.	Dil. C12, 0,015 g	Toxicodendron quercifolium;
Ruta	Dil. C12, 0,015 g	Ruta graveolens; Reg.-Nr.: 2295.55.52
Staph.	Dil. C12, 0,015 g	Delphinium staphisagria;
Symph.	Dil. C12, 0,015 g	Symphytum officinale;
Verat.	Dil. C12, 0,015 g	Veratrum album (HAB 34);

Sonstiger Bestandteil: Sucrose (Saccharose/Zucker)

Stand der Information: März 2016

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Gudjons GmbH
Tel.: 0821 – 4447877

Friedrich-Merz-Str. 5
Fax.: 0821 – 4447879

86153 Augsburg
labor@gudjons.com

www.gudjons.com www.gudjons-shop.com